

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-4-75032718

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

50 FRs

BULLETIN N° 27 - 21 AVRIL 1975.

GRANDES CULTURES

ENNEMIS DU COLZA D'HIVER : les premières captures de *Meligèthes* dans les postes de piégeage ont été enregistrées le 13 avril. Elles sont devenues plus importantes à la fin de la semaine dernière favorisées par le temps chaud. La végétation du colza a nettement progressé depuis ces derniers jours et la plupart des champs sont au stade floraison. Les *Meligèthes* vont donc surtout se concentrer dans les fleurs, en rendant tout traitement inutile. Une intervention ne peut se justifier que dans des cultures à développement irrégulier, avec très peu de fleurs et de fortes populations (3 *Meligèthes* par inflorescence au stade boutons séparés).

Les premiers charançons ont été capturés. Surveiller les cultures si le temps actuel persiste. Ne traiter que si la présence d'1 adulte par hampe est constatée à l'intérieur du champ, (20 m. au moins).

ALTISES DU LIN ET DES CRUCIFÈRES : l'enrobage des semences avec une spécialité à forte teneur en Lindane permet de limiter les dégâts lors de la germination. Pour lutter contre les maladies des jeunes plantules, notamment *Botrytis*, *Ascochyta*, *Alternaria* sur lin, un fongicide (Manèbe, Thirame, Oxyquinoléate de cuivre, Silicate de Méthoxyéthylmercure) pourra être associé à l'insecticide.

TORDEUSE DES CÉRÉALES : sur Orge, l'intervention ne se justifie qu'à partir du moment où est relevée la présence de deux chenilles mineuses pour 10 pieds (sondage sur 250 pieds pris au hasard). Le blé d'hiver semble pouvoir supporter une infestation plus forte. Les traitements peuvent être éventuellement limités aux bordures des bois et boqueteaux. Sont efficaces : Parathion éthyl et Oléoparathion 250 g, Parathion méthyl 400 g, Fénitrothion 500 g, Phosalone 700 g, Diéthion, Malathion et Oléomalathion 1000 g de m.a. En traitement tardif préférer l'Oléoparathion. Actuellement les premières mines sont observées. Il est encore un peu tôt pour se faire une opinion sur l'opportunité d'une intervention.

CULTURES LÉGUMIÈRES

MOUCHE DU CHOU : Les sorties d'adultes sont plus fréquentes depuis une semaine.

MOUCHE DE L'ASPERGE : dans les jeunes aspergeraies non encore en production, les traitements doivent débiter dès la sortie des turions.

SITONE DU POIS : la lutte ne se justifie qu'en cas de végétation lente et forte population d'insectes. Utiliser alors : Parathions 25 g, Lindane 30 g, Phosalone 50 g de m.a./hl en pulvérisation ou mieux les mêmes produits en poudrage.

TEIGNE DU POIREAU : reprise d'activité des adultes.

SEPTORIOSE DU CELERI : la protection des pépinières peut être assurée avec : Bénomyl et Carbendazim 40 g, Oxyquinoléate 60 g, Méthylthiophanate 70 g, Captafol, Mancozèbe, Manèbe 160 g, Propinèbe 210 g, les associations Carbatène + Manèbe (40 + 120 g), Bénomyl + Mancozèbe (30 + 192 g) de m.a./hl et les produits cupriques à 250 g de cuivre/hectolitre.

ENNEMIS DU FRAISIER : *BOTRYTIS*, le premier traitement s'effectue au stade boutons blancs, le second en cours de floraison. Sont efficaces : Bénomyl et Carbendazim 30 g, Méthylthiophanate 70 g, Dichlofluanide 125 g, Folpel 150 g, Thirame 320 g de m.a./hl. Utiliser 1500 à 2000 l de liquide à l'hectare.

PUCERONS ET ACARIENS : la présence de ces ravageurs est surtout à craindre actuellement sur cultures sous abris. Si un traitement était nécessaire, utiliser : Diéthion, Endosulfan,

7360

Phosalone, efficaces sur ces deux ennemis et non dangereux pour les abeilles. Ces produits sont interdits 15 jours avant récolte.

ANTHRACNOSE DU HARICOT : l'enrobage des semences avec Bénomyl et Carbendazim 40 g de m.a./quintal assure une protection efficace à la levée. En végétation, la lutte peut être assurée par pulvérisation des cultures (à jet porté). Les produits les plus efficaces sont : Bénomyl et Carbendazim 40 g, Méthylthiophanate + Manèbe (100 g + 200 g) de m.a./hl., à raison de 200 à 400 l de bouillie/hectare. En action préventive, peuvent être utilisés : Captane, Folpel, Mancozèbe, Manèbe, Thirame, Zinèbe, Zirame à raison de 200 g de m.a./hl. Les traitements doivent avoir lieu aux stades suivants :

* deux feuilles étalées - * premiers boutons - * apparition des premières gousses.

Les deux premiers sont inutiles sur les variétés résistantes à l'Anthracnose. Le 3ème est par contre indispensable pour lutter contre le Botrytis.

CULTURES FRUITIERES

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER : Les projections d'ascospores peuvent maintenant être importantes. La végétation s'est accrue, avec le réchauffement, d'environ 2 à 2,5 Fois depuis le dernier bulletin, sur Poirier et de 6 à 7 Fois sur Pommier (Golden). Des contaminations faibles à moyennes ont pu se produire les 11 et 14 avril. Des taches devraient éventuellement apparaître à partir de la fin du mois.

Avec les températures, les risques de contamination en cas de pluie sont sérieux. La protection des arbres fruitiers doit être correctement assurée.

BACTERIOSE DU POIRIER : le froid a favorisé les attaques; des dégâts ont été observés. Seul le cuivre est actif mais il peut être cause de phytotoxicité. Actuellement il peut être utilisé à 75 g de cuivre par hectolitre.

OIDIUM DU POMMIER : les pousses atteintes sont de plus en plus nombreuses. La lutte chimique doit être accompagnée de l'élimination des pousses contaminées.

RAVAGEURS : le temps chaud va favoriser leur activité (Pucerons, Psylles, Acariens, Chenilles ...).

ACARIENS : la densité des oeufs d'hiver de Panonychus ulmi apparemment très faible limite la qualité de nos renseignements. La Station recherche des vergers où des pontes notables auraient été observées. Les premières éclosions se sont produites. En cas de forte population, intervenir dès qu'il y a environ 50 % des éclosions avec Tétrasil. A titre indicatif, le seuil d'intervention retenu est de 65 % des feuilles occupées (1 ou plusieurs formes mobiles), sondage à faire sur 50 arbres.

Nous rappelons que la lutte contre les Acariens ne peut s'envisager rationnellement que selon un programme de lutte "dirigée", avec intervention éventuelle dans la première quinzaine d'août pour limiter les pontes d'hiver.

CHENILLES DEFOLIATRICES : les premiers dégâts de Cheimatie sont visibles. La lutte ne doit être entreprise que s'il y a plus de 5 à 10 % d'organes attaqués. Pour les produits, préférer Phosalone, Trichlorfon ou Bacillus thuringiensis.

HOPLOCAMPES DU POMMIER : les traitements ne sont à appliquer que dans les vergers attaqués l'année dernière. L'intervention doit avoir lieu aux 3/4 de la chute des pétales.

CHARANCONS PHYLLOPHAGES : les premiers insectes ont été observés. En cas de nécessité, utiliser le Lindane à 30 g de m.a./hl.

PUCERONS : ces insectes se sont peu manifestés. Les seuils d'intervention sont:

P. cendré : 2% - P. vert migrant : 50% - P. lanigère : 10% des pousses attaquées.

Contre ce dernier, utiliser le Vamidothion à 50 g de m.a./hl.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER : les risques de projection persistent. La végétation s'est fortement accrue.

**L'Ingénieur et le Technicien chargés des
Avertissements Agricoles
H. SIMON et R. MERLING**

**L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
R. SARRAZIN**